

**С.Г. Зайчикова
Е.И. Барабанов**

БОТАНИКА

УЧЕБНИК

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И КОЛЛЕДЖЕЙ

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» к использованию
в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования по специальности 33.02.01 (060301.65) «Фармация»
по ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины»,
ОП.07 «Ботаника» по дисциплине «Ботаника»



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2020

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛЕТКИ

Клетка — основная структурно-функциональная единица животных, растений и грибов. Понятие о клетке и ее строении возникло в связи с изобретением микроскопа в 1590 г. голландскими мастерами братьями Янсен. Впервые увидел и описал клетку английский естествоиспытатель Роберт Гук в 1665 г. Рассматривая в микроскоп тонкий срез бутылочной пробки, он обнаружил, что пробка состоит из многочисленных камер, и назвал их клетками. М. Мальпиги (1671) и Н. Грю (1682) первыми описали микроскопическое строение органов растений, подтвердив их клеточное строение. В 1676 г. А. Левенгук открыл мир микроскопических растений и описал окрашенные включения в клетках высших растений и водорослей. До XIX века существовало представление, что основные функции клетки связаны с ее стенкой, а содержимому клетки отводилась второстепенная роль. С усовершенствованием микротехники расширялись и познания о внутреннем содержимом клетки. Так, в 1831 г. Р. Браун обнаружил в клетке ядро и описал его как важнейшее образование. В 1839 г. Я. Пуркинье ввел новый термин «протоплазма», т.е. живое содержимое клетки.

Обобщив все накопленные знания в области клетки, ботаник М. Шлейден (1838) и зоолог Т. Шванн (1839) сформулировали клеточную теорию, основным утверждением которой было: клетка есть единая элементарная и функциональная структура всех живых организмов.

В 1858 г. Р. Вирхов добавил новое положение к клеточной теории, обосновав принцип преемственности клеток путем деления (каждая клетка образуется из клетки).

В 1946 г. с применением электронного микроскопа была установлена тонкая структура клетки, получившая название ультраструктуры.

СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Все растения являются эукариотами, так как имеют оформленное ядро (греч. *karyon* — ядро). Более примитивные организмы — бактерии и, в частности, цианобактерии (сине-зеленые водоросли), являющиеся прокариотами (доядерными организмами), отличаются по ряду признаков от эукариот (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Основные особенности прокариот и эукариот

Признак	Прокариоты	Эукариоты
	<i>бактерии</i>	<i>грибы, водоросли, растения</i>
<i>Размер клеток, мкм</i>	1–10	10–100 и более
<i>Внешний вид организма</i>	Одноклеточные, колониальные, нитчатые, подвижные и неподвижные	Одноклеточные, колониальные (подвижные и неподвижные), нитчатые, многоклеточные
<i>Наличие ядра</i>	Не имеют ограниченного мембраной ядра	Ядро имеет ядерную мембрану
<i>ДНК</i>	Кольцевая ДНК в цитоплазме	Очень длинная, линейная молекула ДНК, организованная в хромосомы и окруженная ядерной мембраной
<i>Деление клеток</i>	Равновеликое бинарное деление или перетяжками	Митоз или мейоз

Плоидность	Гаплоидные организмы	Гаплоидные и диплоидные организмы. В цикле развития идет чередование гаплоидной и диплоидной фаз
Органеллы цитоплазмы	Мезосомы, рибосомы, газовые вакуоли, разные гранулы	Двумембранные: митохондрии, пластиды. Одномембранные: ЭПС, диктиосомы (аппарат Гольджи), вакуоли, лизосомы, микротельца. Немембранные: рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты
Наличие межклеточных связей	Межклеточных связей нет	У растений клетки связаны плазмодесмами
Способы питания	Гетеротрофные и автотрофные (хемо- и фотосинтезирующие организмы)	Гетеротрофные и автотрофные (фотосинтезирующие) организмы
Пигменты фотосинтеза	Бактериохлорофилл, бактериокаротин, хлорофилл А, каротин, фикобиллины (фикоциан, фикоэритрин)	Хлорофилл а, b, c, d, каротин, ксантофилл
Клеточная стенка	Гликопептид (муреин)	Состоит из полисахаридов: целлюлозы, гемицеллюлозы, пектиновых веществ

Примечание. ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота, ЭПС — эндоплазматическая сеть.

ПРОТОПЛАСТ

Во взрослой растительной клетке (рис. 1.1) выделяют: **протопласт** — живое содержимое клетки и *производные протопласта*. Протопласт представляет собой *цитоплазму* и *ядро*; к производным протопласта относят целлюлозную *клеточную стенку* (оболочку) и *вакуоль*.

В состав цитоплазмы входит гиалоплазма — внутренняя жидкая среда клетки, в которую погружены клеточные органеллы. Для




Рис. 1.1. Схема строения растительной клетки
(электронная микроскопия):

1 — ядро; 2 — ядерная оболочка (две мембраны — внутренняя и внешняя и перинуклеарное пространство); 3 — ядерная пора; 4 — ядрышко; 5 — конденсированный хроматин; 6 — диффузный хроматин; 7 — клеточная стенка; 8 — плазмалемма; 9 — плазмодесмы; 10 — эндоплазматическая агранулярная сеть; 11 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 12 — митохондрии; 13 — свободные рибосомы; 14 — лизосомы; 15 — хлоропласт; 16 — диктиосома аппарата Гольджи; 17 — гиалоплазма; 18 — тонопласт; 19 — вакуоль с клеточным соком

живых растительных клеток характерно движение цитоплазмы вместе с погруженными в нее органеллами и ядром, называемое током цитоплазмы, или *циклозом*. *Гиалоплазма* представляет собой сложный бесцветный коллоидный раствор слизистой консистенции. Одним из проявлений живого состояния гиалоплазмы является переход коллоидной системы с преобладанием дисперсионной среды — воды (*золя*) в *гель*, находящийся в более вязком состоянии, и обратно. Гиалоплазма содержит воду (70–90%), в которой растворены ионы минеральных солей, играющие важную роль в создании осмотического давления в клетке. В состав гиалоплазмы входят также растворимые белки, рибонуклеиновая кислота (РНК), полисахариды, липиды.

Вещества, входящие в состав живой клетки, объединяют в понятие *конституционные*, т.е. участвующие в обмене веществ. Основными

классами конституционных органических веществ являются белки, нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы.

Белки — вещества, определяющие строение и свойства живой материи. На их долю приходится основная масса органических веществ клетки. Они участвуют в построении структуры и функций всех клеточных органелл. Белки выполняют важную ферментативную функцию, постоянно участвуя в процессах синтеза и распада конституционных веществ. Белки могут быть и эргастическими веществами клетки, т.е. откладываться в запас, а также выполнять сократительную, транспортную функции и могут служить источником энергии.

Белки — это биополимеры, состоящие из аминокислот, соединенных пептидными связями. Из известных 40 аминокислот в состав белков входят 20. Простые белки — *протеины* — состоят только из аминокислот и откладываются в клетке в качестве запасных веществ. Простые белки могут соединяться с углеводами (гликопротеиды), нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды), жирными кислотами (липопротеиды), и тогда они называются сложными белками — *протеидами*. Протеиды являются *конституционными* белками, так как входят в состав цитоплазмы и ядра.

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) — важная группа фосфор-содержащих биополимеров, обеспечивающая хранение и передачу наследственной информации. Мономером нуклеиновых кислот является нуклеотид, включающий в себя азотистое основание, сахар и остаток фосфорной кислоты. Для каждого вида характерен свой нуклеотидный состав нуклеиновых кислот.

Молекула ДНК состоит из 2 полинуклеотидных антипараллельных цепей, закрученных в двойную спираль вокруг центральной оси. Цепи выстраиваются по типу комплементарности между азотистыми основаниями, образующими между собой водородные связи. Структура ДНК описана в 1953 г. Д. Уотсоном и Ф. Криком. РНК, в отличие от ДНК, представляет собой одноцепочечную молекулу (табл. 1.2). ДНК и РНК могут находиться как в ядре, так и в цитоплазме, а также в митохондриях и хлоропластах.

Липиды (фосфолипиды) — жироподобные вещества, которые являются структурными компонентами клетки, так как входят в состав клеточной мембраны (плазмолемма, тонопласт). Протопласт растительной клетки содержит: простые липиды (жирные масла), полимерные липиды (воск, кутин, суберин) и сложные липиды (липоиды, или жироподобные вещества). Простые липиды

Таблица 1.2. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК)

Нуклеиновая кислота	Пуриновое основание	Пиримидиновое основание	Сахар	Остаток фосфорной кислоты
ДНК	Аденин Гуанин	Цитозин Тимин	Дезокси-рибоза	Имеется
РНК	Аденин Гуанин	Цитозин Урацил	Рибоза	Имеется

состоят из остатков жирных кислот и спиртов (жиры, воски). Сложные липиды — это комплексы липидов, их соединения с белками (липопротеиды), фосфорной кислотой (фосфолипиды), сахарами (гликолипиды). Некоторые пигменты (каротиноиды) также относят к сложным липидам. Липиды являются одним из основных компонентов биологических мембран, а также составляют их энергетический резерв.

Углеводы входят в состав гиалоплазмы в виде моносахаридов (глюкоза, фруктоза), дисахаридов (сахароза, мальтоза и др.) и полисахаридов (крахмал, гликоген).

У растений моносахариды являются первичным продуктом фотосинтеза и используются для биосинтеза полисахаридов, аминокислот, жирных кислот и др. Углеводы запасаются в виде крахмала как энергетический резерв растений. Некоторые углеводные полимеры служат опорным материалом жестких клеточных стенок (целлюлоза) или выполняют функцию цементирующего материала в межклеточном пространстве (пектины).

ОРГАНЕЛЛЫ ЦИТОПЛАЗМЫ

В гиалоплазме находятся различные по своим функциям клеточные органеллы: митохондрии, пластиды, диктиосомы, ЭПС, микротельца, лизосомы, рибосомы, сферосомы, микротрубочки, микрофиламенты (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Строение растительной клетки

Цитоплазма	Функции
Гиалоплазма	Внутренняя среда клетки
Клеточные органеллы	Функциональные структуры клетки

В том числе:	
Двумембранные	
митохондрии	Синтез АТФ
пластиды	Фотосинтез, запасающая
Одномембранные	
ЭПС	Синтез, транспорт
диктиосомы	Упаковка, синтез, транспорт
вакуоль	Запас воды с растворенными веществами, тургор
Микротельца	
пероксисомы листьев	Участие в фотодыхании
глиоксисомы	Метаболизм жиров
Немембранные	
рибосомы	Синтез белков
микротрубочки	Цитоскелет, веретено деления
микрофиламенты	Цитоскелет
Органоиды специального назначения	
Жгутики и ундулиподии	Органоиды движения

ДВУМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ

Митохондрия (рис. 1.2) — двумембранный органоид. Внутренняя мембрана образует выросты — кристы. При аэробном дыхании на кристах происходят окислительное фосфорилирование и перенос электронов. Внутреннее содержимое митохондрий — матрикс — включает рибосомы, кольцевую молекулу ДНК и фосфатные гранулы. В матриксе находятся ферменты, участвующие в цикле Кребса и окислении жирных кислот.

Хлоропласт (рис. 1.3) — крупная двумембранная пластида, в которой протекает фотосинтез за счет наличия пигментов: хлорофиллов, каротиноидов и ксантофиллов. Внутренняя среда хлоропласта — студенистообразный матрикс — строма. Строма содержит рибосомы, кольцевую молекулу ДНК и капельки масла. В строме протекает темновая фаза фотосинтеза, в которой непосредственно происходит синтез органических соединений с использованием энергии, синтезированной в световую фазу. В строме на ламеллах находится система мембран-тилакоидов, собранных в стопки-граны, в которых




Рис. 1.2. Схемы строения митохондрии в трехмерном изображении (А) и на срезе (Б):
1 — наружная мембрана митохондрии; 2 — внутренняя мембрана; 3 — криста; 4 — рибосома; 5 — матрикс; 6 — кольцевая нить ДНК




Рис. 1.3. Строение хлоропласта:
А — объемная схема строения хлоропласта; Б — схема среза через хлоропласт; 1 — наружная мембрана; 2 — внутренняя мембрана; 3 — строма; 4 — грана; 5 — тилакоид грана; 6 — ламелла; 7 — ДНК; 8 — рибосомы хлоропласта (отличаются от цитоплазматических рибосом); 9 — крахмальные зерна

может откладываться крахмал. В тилакоидах протекает световая фаза фотосинтеза, в ходе которой осуществляются процессы циклического и нециклического фосфорилирования и фотолиза воды под действием квантов света. Хлоропласты могут превратиться в хромопласты (пожелтение листьев) или в лейкопласты (если поместить растение в темноту).

Хромопласт — окрашенная пластида, содержащая пигменты: каротиноиды (оранжевые) и ксантофиллы (желтые). Хромопласты являются конечным этапом в развитии пластид, поэтому у них, как правило, отсутствует внутренняя мембранная система. От хлоропластов они отличаются меньшими размерами и разнообразной формой (рис. 1.4).




Рис. 1.4. Строение хромопласта:

А — внешний вид: 1 — наружная мембрана; 2 — внутренняя мембрана; 3 — жировые капли; 4 — ламеллы; Б, В — хромопласты в клетках мякоти зрелых плодов рябины (*Sorbus aucuparia*) и боярышника (*Crataegus sanguinea*) соответственно: 1 — хромопласты; 2 — ядро; 3 — стенка клетки

Больше всего хромопластов в плодах томата, красного перца, в цветках, где их яркая окраска служит для привлечения насекомых и птиц, участвующих в опылении растений и распространении семян.

Лейкопласт — бесцветная пластида, не содержащая пигментов. В отличие от хлоропластов у лейкопластов слабо развитая мембранная система и редко расположенные одиночные тилакоиды. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и хромопласты.

Лейкопласты приспособлены для хранения запасных питательных веществ, поэтому их особенно много в запасяющих органах: корнях, семенах, молодых листьях (рис. 1.5). В амилопластах откладывается запасной крахмал; в олеопластах — жир; в протеинопластах — белки.




Рис. 1.5. Строение лейкопласта:

А — внешний вид лейкопласта: 1 — наружная мембрана; 2 — внутренняя мембрана; 3 — ламелла; 4 — строма; Б — лейкопласты (1) в клетках листа традесканции

ОДНОМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) — система уплощенных одно-мембранных мешочков (цистерн) в виде трубочек и пластинок, образующих единое целое с наружной мембраной ядерной оболочки (рис. 1.6). Различают 2 типа ЭПС: при наличии на поверхности ЭПС




Рис. 1.6. Строение эндоплазматической сети:

А — цистерны гранулярной ЭПС; Б — система цистерн гранулярной ЭПС и трубок агранулярной ЭПС; 1 — цистерна гранулярной ЭПС; 2 — рибосома; 3 — пузырек Гольджи; 4 — цистерны диктиосомы; 5 — вакуоль; 6 — трубка агранулярной ЭПС; 7 — окна в ретикулярной цистерне; 8 — прикрепленная полисома

рибосом — она называется шероховатой, или гранулярной, а если рибосом нет — гладкой. На рибосомах шероховатой ЭПС происходит синтез белков, а на мембранах гладкой ЭПС — синтез веществ небелковой природы (углеводы, липиды).

Диктиосома (аппарат Гольджи) — стопка уплощенных одномонобланнх мешочков (цистерн; рис. 1.7). На одном конце стопки мешочки образуются непрерывно, а на другом — отшнуровываются в виде пузырьков Гольджи. Стопки могут существовать и в виде дискретных (отдельных) диктиосом.

Диктиосомы участвуют в процессе секреции и синтеза углеводов (растительная клеточная стенка); в них образуются первичные лизосомы. Многие ферменты, синтезируемые на ЭПС, претерпевают модификацию в цистернах и транспортируются пузырьками Гольджи.

Микротельца — органеллы, не совсем правильной сферической формы с зернистой структурой, но иногда в них попадают кристаллоиды или скопление нитей.

Глиоксисомы имеют отношение к метаболизму глиоксилата и участвуют в превращении липидов в сахарозу в некоторых богатых маслами семенах (например, в эндосперме семени клещевины).

Пероксисомы содержат фермент каталазу, ускоряющую разложение перекиси водорода на воду и кислород. Перекись водорода является побочным продуктом некоторых окислительных процессов, протекающих в клетке. Она очень токсична и должна немедленно удаляться из клетки. Пероксисомы листьев тесно связаны с процессом фотодыхания при участии хлоропластов и митохондрий.




Рис. 1.7. Строение диктиосомы (аппарат Гольджи):
1 — пузырек Гольджи; 2 — цистерна диктиосомы в плане

НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ.

Рибосомы — очень мелкие немембранные органеллы, состоящие из 2 субчастиц (единиц): большой и малой. Они состоят из РНК и белка. Рибосомы свободно располагаются в цитоплазме или прикрепляются к мембранам ЭПС (рис. 1.8). Рибосомы способны образовывать полисому, в которой они нанизаны на единую нить информационной РНК. В рибосомах происходит синтез белка.

Микротрубочки — тонкие цилиндрические структуры, состоящие из субъединиц белка, называемого *тубулином*. Микротрубочки контролируют упаковку целлюлозных микрофибрилл при формировании клеточной стенки; участвуют в формировании веретена деления.

Микрофиламенты — это длинные нити, состоящие из сократительного белка актина. Пучки микрофиламентов играют определяющую роль в токах цитоплазмы. Микрофиламенты вместе с микротрубочками образуют гибкую сеть, называемую *цитоскелетом*.

ОРГАНЕЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Жгутики, реснички, фимбрии — двигательные приспособления прокариот. Базальная расширенная часть жгутиков называется базальным тельцем.

У определенной части эукариотических клеток двигательными приспособлениями являются ундулоподии, отличающиеся по строению от жгутиковидных образований. Ундулоподии имеются у многих протоктистов — водорослей и грибоподобных (см. главу 5), особенно




Рис. 1.8. Схема строения рибосомы, сидящей на мембране ЭПС:

- 1 — малая субъединица; 2 — иРНК;
- 3 — аминокислот-тРНК; 4 — аминокислота;
- 5 — большая субъединица;
- 6 — мембрана ЭПС; 7 — синтезируемая полипептидная цепь

на одноклеточных стадиях их жизненного цикла. У таких растений, как мхи, папоротники и часть голосеменных, ундулиподиями снабжены только мужские половые клетки. Ундулиподии снаружи покрыты мембраной, которая представляет собой единое целое с плазматической мембраной клетки. На поперечном срезе 9 пар микротрубочек образуют кольцо, а 2 дополнительные микротрубочки располагаются в центре кольца (организация: 9+2). Ундулиподии отходят от цилиндрических структур, называемых *кинетосомами*. У кинетосом на поперечном срезе заметно лишь периферическое кольцо микротрубочек, собранных по 3 (организация: 9+0). Движение ундулиподиев может также осуществляться автономно, они способны двигаться и после отделения от клетки.

ЯДРО

Ядро — самая крупная органелла, имеющая двумембранную оболочку, пронизанную ядерными порами. В матриксе ядра находится хроматин: *гетерохроматин* (компактный, менее активный) и *эухроматин* (диффузный, активный) — в такой форме раскрученные хромосомы находятся в интерфазе. Хромосомы содержат нуклеиновую кислоту ДНК, отвечающую за наследственность. Внутри ядра содержится хорошо заметная округлая структура — *ядрышко*, в котором происходит синтез рибосомальной РНК (рРНК); ядрышек может быть несколько. Деление ядра лежит в основе размножения клеток.

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

Цитоплазматическая мембрана, отделяющая цитоплазму от клеточной стенки, называется *плазмалеммой* (плазматической мембраной), а отделяющая ее от вакуоли — *тонопластом* (элементарной мембраной).

В настоящее время пользуются жидкостно-мозаичной моделью мембраны (рис. 1.9), в соответствии с которой мембрана состоит из бислоя липидных молекул (фосфолипидов) с гидрофильными головками и 2 гидрофобными хвостами, обращенными внутрь слоя. Помимо липидов в состав мембран входят белки.

Различают 3 типа мембранных белков, «плавающих» в билипидном слое: *интегральные* белки, пронизывающие всю толщу бислоя; *полуинтегральные*, пронизывающие бислой неполностью; *периферические*, прикрепляющиеся с внешней или внутренней стороны мембраны к другим мембранным белкам. Мембранные белки выполня-




Рис. 1.9. Схема строения биологической мембраны:

А — внеклеточное пространство; Б — цитоплазма; 1 — бимолекулярный слой липидов; 2 — периферический белок; 3 — гидрофильная область интегрального белка; 4 — гидрофобная область интегрального белка; 5 — углеводная цепь

ют различные функции: одни из них являются ферментами, другие выполняют роль переносчиков специфических молекул через мембрану или образуют гидрофильные поры, через которые могут проходить полярные молекулы.

Одним из основных свойств клеточных мембран является их полупроницаемость: они пропускают воду, но не пропускают растворенные в ней вещества, т.е. обладают избирательной проницаемостью.

Транспорт через мембраны

В зависимости от затрат энергии транспорт веществ и ионов через мембрану делится на пассивный, не требующий затрат энер-

гии, и активный, связанный с потреблением энергии. К *пассивному транспорту* относятся такие процессы, как *диффузия*, *облегченная диффузия*, *осмос*.

Диффузия — это процесс проникновения молекул через липидный бислой по градиенту концентраций (из области большей концентрации в область меньшей). Чем меньше молекула и чем более неполярная, тем быстрее она диффундирует через мембрану.

При *облегченной диффузии* прохождению вещества через мембрану помогает какой-либо транспортный белок. Таким образом, в клетку поступают различные полярные молекулы, такие, как сахара, аминокислоты, нуклеотиды и др.

Осмос — это диффузия воды через полупроницаемые мембраны. Осмос вызывает передвижение воды из раствора с высоким водным потенциалом в раствор — с низким водным потенциалом.

Активный транспорт — это перенос молекул и ионов через мембрану, сопровождаемый энергетическими затратами. Активный транспорт идет против градиента концентрации и электрохимического градиента и использует энергию АТФ. В основе механизма активного транспорта веществ лежит работа протонного насоса (H^+ и K^+) у растений и грибов, которые сохраняют внутри клетки высокую концентрацию K^+ и низкую — H^+ (Na^+ и K^+ — у животных). Энергия, необходимая для работы этого насоса, поставляется в виде АТФ, синтезируемой в процессе клеточного дыхания.

Известна еще одна разновидность активного транспорта — *эндо- и экзоцитоз*. Это 2 активных процесса, с помощью которых различные молекулы транспортируются через мембрану в клетку (*эндоцитоз*) либо из нее (*экзоцитоз*).

При *эндоцитозе* вещества попадают в клетку в результате инвагинации (впячивания) плазматической мембраны. Образующиеся при этом пузырьки, или вакуоли, переносятся в цитоплазму вместе с заключенными в них веществами. *Поглощение* больших частиц, таких, как микроорганизмы или обломки клеток, называется *фагоцитозом*. В этом случае образуются крупные пузырьки, называемые вакуолями. Поглощение жидкостей (суспензий, коллоидных растворов) или растворенных веществ с помощью небольших пузырьков носит название *пиноцитоз*.

Обратный *эндоцитозу* процесс называется *экзоцитозом*. Многие вещества выводятся из клетки в специальных пузырьках или вакуолях. Примером может служить вывод из секреторных клеток их жид-

ких секретов; другой пример — это участие пузырьков диктиосом в формировании клеточной оболочки.

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОТОПЛАСТА

Вакуоль

Вакуоль — это резервуар, ограниченный одинарной мембраной — *тонопластом*. В вакуоли содержится клеточный сок — концентрированный раствор различных веществ, таких, как минеральные соли, сахара, пигменты, органические кислоты, ферменты. В зрелых клетках вакуоли сливаются в одну, центральную.

В вакуолях хранятся различные вещества, в том числе конечные продукты обмена. От содержимого вакуоли в сильной степени зависят осмотические свойства клетки.

В связи с тем что вакуоли содержат крепкие растворы солей и других веществ, клетки растений постоянно осмотически поглощают воду и создают гидростатическое давление на клеточную стенку, называемое *тургорным*. Тургорному давлению противостоит равное ему по величине давление клеточной стенки, направленное внутрь клетки. Большинство растительных клеток существуют в гипотонической среде. Но если такую клетку поместить в гипертонический раствор, вода по законам осмоса начнет выходить из клетки (для выравнивания водного потенциала по обе стороны мембраны). Вакуоль при этом сократится в объеме, ее давление на протопласт уменьшится, и *мембрана начнет отходить от клеточной стенки*. Явление отхождения протопласта от клеточной стенки называется *плазмолизом*. В природных условиях такая потеря тургора в клетках приведет к увяданию растения, опусканию листьев и стеблей. Однако этот процесс обратим: если клетку поместить в воду (например, при поливе растения), возникает явление, обратное плазмолизу — *деплазмолиз* (рис. 1.10).

Включения

Клеточными включениями являются *запасные* и *экскреторные* вещества.

Запасные вещества (временно выключенные из обмена) и вместе с ними отбросы (экскреторные вещества) часто называют *эргастическими*.




Рис. 1.10. Схема плазмолиза:

А — клетка в состоянии тургора (в изотоническом растворе); Б — начало плазмолиза (клетка, помещенная в 6% раствор KNO_3); В — полный плазмолиз (клетка, помещенная в 10% раствор KNO_3); 1 — хлоропласт; 2 — ядро; 3 — клеточная стенка; 4 — протопласт; 5 — центральная вакуоль

ческими веществами клетки. К запасным веществам относят запасные белки, жиры и углеводы. Эти вещества накапливаются в течение вегетационного периода в семенах, плодах, подземных органах растения и в сердцевине стебля.

Запасные вещества

Запасные белки, относящиеся к простым белкам — протеинам, чаще откладываются в семенах. Осаждающиеся белки в вакуолях образуют зерна округлой или эллиптической формы, называемые *алейроновыми*. Если алейроновые зерна не имеют заметной внутренней структуры и состоят из аморфного белка, их называют *простыми*. Если в алейроновых зернах среди аморфного белка встречаются кристаллоподобная структура (*кристаллоид*) и блестящие бесцветные тельца округлой формы (*глобуиды*), такие алейроновые зерна называют *сложными* (рис. 1.11). Аморфный белок алейронового зерна представлен гомогенным непрозрачным белком желтовато-




Рис. 1.11. Сложные алейроновые зерна:

1 — поры в оболочке; 2 — глобоиды; 3 — аморфная белковая масса; 4 — кристаллоиды, погруженные в аморфную белковую массу

го цвета, набухающим в воде. Кристаллоиды имеют характерную для кристаллов ромбоэдрическую форму, но в отличие от истинных кристаллов составляющий их белок набухает в воде. Глобоиды состоят из кальциево-магниевой соли, содержат фосфор, нерастворимы в воде и не дают реакцию на белки.

Запасные липиды обычно располагаются в гиалоплазме в виде капель и встречаются почти во всех растительных клетках. Это основной тип запасных питательных веществ большинства растений: наиболее богаты ими семена и плоды. Жиры (липиды) — наиболее калорийное запасное вещество. Реактивом на жироподобные вещества является судан III, окрашивающий их в оранжевый цвет.

Углеводы входят в состав каждой клетки в виде растворимых в воде сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы) и нерастворимых в воде полисахаридов (целлюлозы, крахмала). В клетке углеводы играют роль источника энергии для реакций обмена веществ. Сахара, связываясь с другими биологическими веществами клетки, образуют гликозиды, а полисахариды с белками — гликопротеины. Состав углеводов рас-

тительной клетки значительно более разнообразен, чем у животных клеток, за счет разнообразного состава полисахаридов клеточной оболочки и сахаров клеточного сока вакуолей.

Главнейшим и наиболее распространенным *запасным углеводом* является полисахарид *крахмал*. Первичный ассимиляционный крахмал образуется в хлоропластах. Ночью, при прекращении фотосинтеза, крахмал гидролизуеться до сахаров и транспортируется в запасающие ткани — клубни, луковицы, корневища. Там в особых типах лейкопластов — амилопластах — часть сахаров откладывается в виде зерен вторичного крахмала. Для крахмальных зерен характерна слоистость, что объясняется различным содержанием воды из-за неравномерного поступления крахмала в течение суток. В темных слоях воды больше, чем в светлых. Зерно с одним центром крахмалообразования в центре амилопласта называют простым *концентрическим*, если центр смещен — простым *эксцентрическим*. Зерно с несколькими крахмалообразующими центрами — *сложное*. У *полусложных зерен* новые слои откладываются вокруг нескольких крахмалообразующих центров, а затем формируются общие слои и покрывают крахмалообразующие центры (рис. 1.12). Реактивом на крахмал является раствор йода, дающий синее окрашивание.

Экскреторные вещества (продукты вторичного обмена)

К клеточным включениям относятся и экскреторные вещества, например кристаллы оксалата кальция (*одиночные кристаллы, рафиды* — игольчатые кристаллы, *друзы* — сrostки кристаллов, *кристаллический песок* — скопление множества мелких кристаллов) (рис. 1.13). Реже кристаллы состоят из карбоната кальция или кремнезема (*цистолиты*; рис. 1.14). Цистолиты откладываются на клеточной стенке, вдающейся внутрь клетки в виде гроздьев винограда, и характерны, например, для представителей семейства крапивных, листьев фукуса.

В отличие от животных, выводящих избыток солей вместе с мочой, растения не имеют развитых органов выделения. Поэтому считается, что кристаллы оксалата кальция являются конечным продуктом метаболизма протопласта, образующимся как приспособление для выведения из обмена излишков кальция. Как правило, эти кристаллы накапливаются в органах, которые растение периодически сбрасывает (листья, кора).




Рис. 1.12. Крахмальные зерна картофеля (А): 1 — простое зерно; 2 — полусложное; 3 — сложное; пшеницы (Б), овса (В)

Эфирные масла скапливаются в листьях (мята, лаванда, шалфей), цветках (шиповник), плодах (цитрусовые) и семенах растений (укроп, анис). Эфирные масла не принимают участия в обмене веществ, но их широко используют в парфюмерии (розовое, жасминное масла), пищевой промышленности (анисовое, укропное масла), медицине (мятное, эвкалиптовое масла). Резервуарами для скопления эфирных масел могут быть желёзки (мята), лизигенные вместилища (цитрусовые), железистые волоски (герань).

Смолы — это комплексные соединения, образующиеся в процессе нормальной жизнедеятельности тканей. Они образуются эпителиальными клетками, выстилающими смоляные ходы, как побочный продукт обмена веществ, часто с эфирными маслами.




Рис. 1.13. Формы кристаллов оксалата кальция в клетках: 1, 2 — рафида (недотрога; 1 — вид сбоку; 2 — на поперечном срезе); 3 — друза (опунция); 4 — кристаллический песок (картофель); 5 — одиночный кристалл (ваниль)




Рис. 1.14. Цистолит (на поперечном срезе листа фикуса): 1 — кожа листа; 2 — цистолит