

# Стр. 2. ОСТАНОВКА СЕРДЦА У МАТЕРИ

1

ДРУГОЕ

- Магния сульфат** → Если продолжается инфузия Mg, **ПРЕКРАТИТЕ**.  
→ Назначьте 10% CaCl<sub>2</sub> 10 мл в/в
- Анестетики** → Если выполняется нейроаксиальная, или ингаляционная, или в/в анестезия — **ПРЕКРАТИТЕ**

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

## Перепроверьте диагноз с командой

### Осложнения анестезии

- Высокий спинальный блок.
- Потеря дыхательных путей.
- Аспирация.
- Угнетение дыхания.
- Гипотензия.
- Системная токсичность местных анестетиков.

### Кровотечение

- Коагулопатия.
- Атония матки.
- Вращение плаценты.
- Отслойка плаценты.
- Предлежание плаценты.
- Разрыв матки.
- Травма.
- Хирургическое.
- Реакция на переливание препаратов крови.

### Сердечно-сосудистые причины

- Кардиомиопатия.
- Инфаркт миокарда.
- Расслоение аорты.
- Аритмия.

### Препараты

- Анафилаксия.
- Незаконное употребление наркотиков.
- Передозировка (магний, опиоид, инсулин или окситоцин)

### Эмболии

- Тромбоэмболия легочной артерии.
- Амниотическая эмболия.
- Воздушная.

### Лихорадка

- Инфекция.
- Сепсис.

### Общие неакушерские причины остановки сердца (Г и Т)

- Гипоксия.
- Гиповолемия.
- Гипо/гиперкалиемия.
- Гипо/гипертермия.
- Гидрогенных (водорода) ионов избыток — ацидоз.
- Гипогликемия.
- Торакальное напряжение — напряженный пневмоторакс.
- Тампонада сердца.
- Токсины.
- Тромбоэмболия.
- Тромбоз коронарных артерий (инфаркт миокарда).
- Травма.

### Гипертензия

- Преэклампсия/эклампсия/HELLP.
- Внутричерепное кровоизлияние